


ІНСТРУКЦІЯ ПІДГОТОВКА ПАЦІЄНТА ТА ПРАВИЛА ВЗЯТТЯ КАЛУ НА КОПРОЦИТОГРАМУ ТА ПРИХОВАНУ КРОВ

Не слід здійснювати збір зразків під час менструального циклу, протягом трьох днів після менструального циклу або якщо пацієнт страждає на геморой, що супроводжується кровотечею, у сечі пацієнта наявна кров або при утрудненому акті дефекації. Надмірне споживання алкоголю, аспірину та інших лікарських засобів може призвести до подразнення слизової оболонки шлунково-кишкового тракту та прихованої кровотечі. Слід припинити прийом цих речовин за 48 годин до проведення тесту.

Протягом 48 годин перед здачею калу не потрібно вживати продуктів, які можуть вплинути на результати дослідження, таких як червоне м'ясо, риби, яєць, помідорів, а також препарати заліза та вітаміни із вмістом заліза. Останній прийом їжі перед збором калу має бути легким та не жирним.

Для взяття зразка калу:

- Забрати достатню кількість кала (1-2 мл/гр) в чистий, сухий контейнер для взяття зразка. Найкращі результати отримуються, якщо аналіз виконується протягом 6 годин після взяття зразка.
- Зібрані зразки можуть зберігатися протягом трьох днів при температурі 2-8°C, якщо неможливо провести випробування протягом 6 годин після взяття зразка. Для довготривалого зберігання зразки слід зберігати за температури нижче -20 °C.
- Створіть електронне направлення у МІС системі та роздрукуйте направлення для лабораторного дослідження.
- За бажанням можливо надати електронну пошту пацієнта, щоб отримати результат дослідження в електронному вигляді.

Завідувач медичною лабораторією  Оксана ПАВЛОВА